

CarniPlus

BIOATTIVATORE

Con elevato contenuto di aminoacidi liberi di tipo levogiro

Apporta aminoacidi liberi di tipo levogiro altamente assimilabili dalla pianta

Migliora la fertilità del suolo e potenzia l'assorbimento radicale e la traslocazione dei nutrienti

Stimola il metabolismo dell'azoto e ne migliora l'efficienza

Caratteristiche

CarniPlus è un concime organico azotato liquido ad alta solubilità, a base di aminoacidi liberi ottenuti da sostanza organica di origine animale. Gli aminoacidi sono presenti in forma levogira (L-forma), ovvero biologicamente attiva ed altamente assimilabile dalle piante. Questa caratteristica ne garantisce un'elevata efficacia fisiologica, rendendo il prodotto particolarmente adatto a tutte le fasi fenologiche in cui la coltura necessita di supporto nutrizionale e stimolazione metabolica. **CarniPlus** stimola lo sviluppo vegetativo e radicale della pianta, favorisce l'ingrossamento di ortaggi e frutti, incrementa l'assorbimento dei nutrienti e migliora la tolleranza agli stress abiotici (termici, idrici, salini). L'applicazione in fertirrigazione, inoltre, contribuisce a migliorare la struttura e la fertilità del suolo, grazie al contenuto di carbonio organico biologicamente attivo che stimola la microflora benefica e favorisce l'equilibrio del microbioma radicale.

Composizione

	p/p*	p/v
Azoto (N) totale	8,5%	11,3%
Carbonio (C) organico	28,3%	37,8%
Azoto (N) organico	8,5%	11,3%

Materie prime: epitelio animale idrolizzato.

*Equivalente a p/v a 20°C.

Dosi e Istruzioni

COLTURE

Arboree
(esclusione susino e pesco)

Orticole

Ornamentali

Industriali

COLTURE

Arboree

Orticole

Ornamentali

Industriali

APPLICAZIONE FOGLIARE

Durante la fase di ingrossamento del frutto

Durante tutto il ciclo vegetativo

Nei primi stadi di sviluppo

Durante tutto il ciclo vegetativo

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE

Dalla fase di ripresa vegetativa e durante tutto il ciclo

Dalla fase di ripresa vegetativa/post-trapianto e durante tutto il ciclo

Dopo il trapianto e durante tutta la fase di crescita

Dalla fase di ripresa vegetativa/post-trapianto e durante tutto il ciclo

DOSI ml/hl*

80-150

80-150

60-100

80-150

DOSI l/ha*

15-25

15-25

15-25

15-25

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione

Liquido solubile

Packaging

1-5-10-20 l

Densità (T=20°C)

~ 1330 kg/m³

pH (sol. 6 %)

~ 7,0

Conducibilità (sol. 10 %)

~ 7,9 dS/m



APPLICAZIONE
FOGLIARE



APPLICAZIONE IN
FERTIRRIGAZIONE



BIOATTIVATORI



BIO