

BioIn Act

FITOFORTIFICANTE

Mejora la salud de las plantas

Aporta un importante contenido de extractos vegetales con la tecnología **PLANTEX SC®**

Apoya induciendo el sistema de defensa natural de la planta

Presenta una elevada capacidad filmógena gracias a la tecnología **ACTIVE-SET®**



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it



BioIn Act

Características

BioIn Act es un innovador activador líquido que actúa en sinergia potenciando los efectos de BioIn Mz. **BioIn Act** es un nuevo fertilizante diseñado para aumentar aún más los mecanismos de defensa endógenos de la planta gracias a los extractos vegetales adicionales que contiene, con la tecnología **PLANTEX SC®**, aceite de soja y su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Entre otros efectos, mejora la acción antitranspirante y filmógena, reduce la pérdida de agua de los tejidos vegetales, mejora la humectación de la vegetación y reduce la actividad y el movimiento de los insectos de cuerpo blando, en los que provoca deshidratación. Su innovadora formulación garantiza, además, una elevada capacidad de adhesión y distribución sobre las superficies tratadas gracias a la tecnología **ACTIVE-SET®**.

Composición

Aceites vegetales (aceite de soja)

100%

Dosis y Modo de Empleo

CULTIVOS	APLICACIÓN EN FERTIRRIGACIÓN	DOSIS ml/hl*
Hortícolas	Durante todo el ciclo de crecimiento, evitando durante la floración	200
Frutales	Durante todo el ciclo de crecimiento, evitando durante la floración	200
Ornamentales	Después de la fase de levantamiento	200
Industriales	Durante todo el ciclo de crecimiento, evitando durante la floración	200

*Las dosis son indicativas y deben ser adaptadas según las características de la zona y las necesidades de cada cultivo.

Formulación

Líquido soluble

Envases

1-5-10-20 L

Densidad (T=20°C)

~ 980 kg/m³

pH (sol. 6 %)

~ 6,4

Conductividad (sol. 10 %)

~ 0,1 dS/m

Advertencias

No superar la dosis máxima recomendada de 2 L/ha por tratamiento. Se recomienda probar el producto en pequeñas áreas y en un número limitado de plantas, adaptando las dosis en caso de sensibilidad/fitotoxicidad. No utilizar en mezcla con aceites minerales y espaciar los tratamientos con estos de la aplicación del producto. No aplicar el producto cerca de la fase de recolección y en fase de floración. Si es necesario, se puede repetir la aplicación. No utilizar en presencia de temperaturas elevadas (T > 30 °C) y en caso de fuerte exposición solar. **Se han obtenido resultados óptimos añadiendo 50 ml/hl de BioIn MZ con 200 ml/hl de BioIn Act.**

Especificaciones



APLICACIÓN EN
FERTIRRIGACIÓN



FITOFORTIFICANTES



BIO

PLANTEX^{SC}

ACTIVE^{SET}



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it