

Fruit Colour

BIOACTIVADOR

Que mejora la calidad de los frutos y el rendimiento final

Mejora las características cualitativas del fruto como los °Brix, la coloración y la firmeza

Aumenta la producción final

Potencia la eficiencia fotosintética y favorece el desarrollo reproductivo



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it

Fruit Colour

Características

Fruit Colour es un bioactivador a base de fósforo (P) y potasio (K), formulado para optimizar la nutrición fosfo-potásica con un pH ácido, lo que favorece una asimilación más rápida y eficaz, y para estimular la actividad metabólica de los cultivos. El producto apoya los principales procesos fisiológicos, promoviendo el desarrollo reproductivo y mejorando la calidad de los frutos. El fósforo es fundamental en los procesos energéticos celulares (ATP, NADPH), favorece la diferenciación floral, regula el equilibrio hormonal y resulta especialmente útil en las fases iniciales del ciclo del cultivo y en la prefloración. El potasio estimula la síntesis de azúcares, almidones y pigmentos, y es esencial para la translocación de fotoasimilados y los procesos relacionados con la maduración del fruto. **Fruit Colour** mejora la absorción y translocación de nutrientes, estimula la fotosíntesis y la síntesis de fitohormonas y aminoácidos, aumentando la eficiencia de la floración y del cuajado. Esto se traduce en un aumento de la cantidad y calidad de la producción, con frutos caracterizados por un mayor contenido de azúcares (°Brix), mayor homogeneidad, coloración intensa, firmeza y una mejor vida útil.

Composición

Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua

6,0%

Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua

56,0%

Dosis y Modo de Empleo

CULTIVOS	APLICACIÓN FOLIAR	DOSIS kg/ha*
Frutales	Desde la hinchazón del fruto hasta la maduración (2-3 aplicaciones)	2-3
Hortícolas	Desde la hinchazón del fruto hasta la maduración (2-3 aplicaciones)	1-2
Industriales	Hasta la etapa de cosecha (4-5 aplicaciones)	2-3
Ornamentales	A lo largo del ciclo de crecimiento	1-2
CULTIVOS	APLICACIÓN EN FERTIRRIGACIÓN	DOSIS kg/ha*
Frutales	Desde el cuajado hasta la maduración del fruto	5-10
Hortícolas	Desde el cuajado hasta la maduración del fruto	4-8
Ornamentales	A lo largo del ciclo de crecimiento	1-3

*Las dosis son indicativas y deben ser adaptadas según las características de la zona y las necesidades de cada cultivo.

Formulación

Cristales solubles

Envases

1-5-10-25 kg

pH (sol. 6 %)

~ 4,9

Conductividad (sol. 10 %)

~ 92,1 dS/m

Advertencias

Cuando se utilice en mezcla con otros productos, se recomienda comprobar la miscibilidad y compatibilidad en un número limitado de plantas, también para valorar posibles reacciones de sensibilidad. Añadir agua al producto respetando la proporción 4:1 agua:producto. Una vez disuelto completamente, llevar al volumen deseado. Se aconseja no mezclar con aceites minerales, emulsiones, productos a base de calcio o azufre, ni con productos de reacción fuertemente ácida.

Especificaciones Técnicas



APLICACIÓN
FOLIAR



APLICACIÓN
EN FERTIRRIGACIÓN



BIOACTIVADORES



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it