

WILDER

FITOFORTIFICANTE
A base de sangre fluida

Aporta nitrógeno orgánico, carbono y aminoácidos de alta biodisponibilidad

Favorece un desarrollo vegetativo equilibrado

Tiene un efecto disuasorio natural sobre la fauna silvestre



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it

Wilder

Características

Wilder es un fertilizante orgánico nitrogenado líquido obtenido a partir de sangre hidrolizada térmicamente, rico en nitrógeno orgánico, carbono y aminoácidos de alta biodisponibilidad. Favorece un crecimiento vegetativo equilibrado, mejora el color y el vigor de la planta, estimula la actividad fotosintética y favorece el desarrollo en los momentos críticos del ciclo de cultivo. La presencia de hierro orgánico ayuda a prevenir la clorosis y las carencias nutricionales, mientras que el carbono favorece la vitalidad microbiológica del suelo. Gracias al olor característico de la matriz orgánica, el producto ejerce un efecto disuasorio natural sobre la fauna silvestre, creando una barrera olfativa desagradable para los ungulados y las aves. Su uso regular contribuye a reducir los daños causados por los animales en viñedos, olivares, huertos frutales y hortícolas, especialmente en zonas cercanas a bosques o áreas con alta presión faunística. Se puede utilizar para aplicaciones nutricionales foliares y de fertirrigación, así como para el tratamiento perimetral.

Composición

	p/p*	p/v		p/p*	w/v
Nitrógeno (N) total	4.0%	4.5%	Carbono (C) orgánico	4.0%	15.7%
Nitrógeno (N) orgánico soluble	3.7%	4.2%			

Materias primas: sangre fluida

*Equivalente a p/v a 20 °C.

Dosis y Modo de Empleo

CULTIVOS	APLICACIÓN FOLIAR	DOSIS ml/hl*
Frutales	Durante la fase de crecimiento del fruto	250-400
Hortícolas	En las primeras fases de desarrollo	250-400
Ornamentales	Durante todo el ciclo de crecimiento	250-400
Industriales	Durante todo el ciclo de crecimiento	250-400

CULTIVOS	APLICACIÓN EN FERTIRRIGACIÓN	DOSIS l/ha*
Frutales	Desde la fase de despertar vegetativo hasta el final del ciclo	15-20
Hortícolas	Desde la fase de recuperación vegetativa/post-trasplante y durante todo el ciclo	15-20
Ornamentales	Desde después del trasplante y durante toda la fase de crecimiento	15-20
Industriales	Desde la fase de recuperación vegetativa/post-trasplante y durante todo el ciclo	15-20
Ungulados y volátiles	Distribución a lo largo del perímetro agrícola a proteger	15-20

*Las dosis son indicativas y deben ser adaptadas según las características de la zona y las necesidades de cada cultivo.

Formulación

Líquido soluble

Envases

5-10-20-1000 l

Densidad (T=20°C)

~ 1125 kg/m³

pH (sol. 6 %)

7

Conductividad (sol. 10 %)

~ 73,8 dS/m

Advertencias

Conservar y manipular a temperaturas comprendidas entre 10 °C y 30 °C. En caso de derrame, recoger con serrín y/o arena. En caso de mezcla con otros productos, se recomienda realizar pruebas preliminares de miscibilidad y compatibilidad en un número limitado de plantas. Si se utiliza en mezcla con fertilizantes o productos sistémicos, se recomienda reducir la dosis del producto y realizar una evaluación preventiva de los efectos. La aplicación en combinación con productos a base de cobre puede causar problemas.

Especificaciones Técnicas



FITOFORTIFICANTES



APLICACIÓN FOLIAR



APLICACIÓN EN FERTIRRIGACIÓN



BIO



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it